

주1: 시메프레비르+소포스부비르 또는 인터페론+리바비린+NS3/4A 단백질분해효소 저해제 (시메프레비르, 보세프레비르, 텔라프레비르 중 하나)

주2: 레디파스비르+소포스부비르 또는 인터페론+리바비린+다클라타스비르


주3: NS5A 저해제(daclatasvir, elbasvir, ledipasvir, ombitasvir, pibrentasvir, velpatasvir) 성분을 포함한 약제

하보니: 고시 제2019-171호(약제): <https://www.hira.or.kr/rc/insu/insuadtcrtcr/InsuAdtCrtrPopup.do?mtgHmeDd=20190801&sno=1&mtgMtrRegSno=0005>

마비렛: 고시 제2021-65호(약제): <https://www.hira.or.kr/rc/insu/insuadtcrtcr/InsuAdtCrtrPopup.do?mtgHmeDd=20210301&sno=2&mtgMtrRegSno=0003>

제파티어: 제2017-77호(약제): <https://www.hira.or.kr/rc/insu/insuadtcrtcr/InsuAdtCrtrPopup.do?mtgHmeDd=20170501&sno=1&mtgMtrRegSno=0001>

엡클루사/보세비: 고시 제2022-250호 http://www.mohw.go.kr/react/jb/sjb0406vw.jsp?PAR_MENU_ID=03&MENU_ID=030406&CONT_SEQ=373441&page=1



주1: 시메프레비르+소포스부비르 또는 인터페론+리바비린+NS3/4A 단백질분해효소 저해제 (시메프레비르, 보세프레비르, 텔라글레비르 중 하나)

주2: 레디파스비르+소포스부비르 또는 인터페론+리바비린+다클라타스비르


주3: NS5A 저해제(daclatasvir, elbasvir, ledipasvir, ombitasvir, pibrentasvir, velpatasvir) 성분을 포함한 약제

하보니: 고시 제2019-171호(약제): <https://www.hira.or.kr/rc/insu/insuadctcrtr/InsuAdtCrtrPopup.do?mtgHmeDd=20190801&sno=1&mtgMtrRegSno=0005>

마비렛: 고시 제2021-65호(약제): <https://www.hira.or.kr/rc/insu/insuadctcrtr/InsuAdtCrtrPopup.do?mtgHmeDd=20210301&sno=2&mtgMtrRegSno=0003>

제파티어: 제2017-77호(약제): <https://www.hira.or.kr/rc/insu/insuadctcrtr/InsuAdtCrtrPopup.do?mtgHmeDd=20170501&sno=1&mtgMtrRegSno=0001>

엡클루사/보세비: 고시 제2022-250호 http://www.mohw.go.kr/react/jb/sjb0406vw.jsp?PAR_MENU_ID=03&MENU_ID=030406&CONT_SEQ=373441&page=1



[주1] 인터페론, 페그인터페론, 리바비린 및/또는 소발디 치료에 실패한 환자

[주2] 인터페론, 페그인터페론 및 또는 리바비린 치료에 실패한 환자

[주3] 이전 치료 경험에 실패한 환자 (페그인터페론 알파/리바비린 또는 NS3/4A 단백질분해효소 저해제+페그인터페론/리바비린 요법 포함)

[주4] 다른 NS3/4A 단백질분해효소 저해제 치료 경험이 없고 이전 페그인터페론 알파 치료에 실패한 환자


[주5] 이전 NS5A 저해제 치료에 실패한 환자

하보니: 고시 제2019-171호(약제): <https://www.hira.or.kr/rc/insu/insuadtcctr/InsuAdtCrtrPopup.do?mtgHmeDd=20190801&sno=1&mtgMtrRegSno=0005>

마비렛: 고시 제2021-65호(약제): <https://www.hira.or.kr/rc/insu/insuadtcctr/InsuAdtCrtrPopup.do?mtgHmeDd=20210301&sno=2&mtgMtrRegSno=0003>

소발디: 고시 제2018-18호(약제): <https://www.hira.or.kr/rc/insu/insuadtcctr/InsuAdtCrtrPopup.do?mtgHmeDd=20180201&sno=1&mtgMtrRegSno=0014>

엡클루사/보세비: 고시 제2022-250호 http://www.mohw.go.kr/react/jb/sjb0406vw.jsp?PAR_MENU_ID=03&MENU_ID=030406&CONT_SEQ=373441&page=1



[주1] 인터페론, 페그인터페론, 리바비린 및/또는 소포스부비르 치료에 실패한 환자

[주2] 인터페론, 페그인터페론 및 또는 리바비린 치료에 실패한 환자


[주3] 다른 NS3/4A 단백질분해효소 저해제 치료 경험이 없고 이전 페그인터페론 알파 치료에 실패한 환자

[주4] 이전 NS5A 저해제 치료에 실패한 환자 또는 이전 NS5A 저해제 없이 소포스부비르가 포함된 HCV 요법으로 치료에 실패한 환자

마비렛: 고시 제2021-65호(약제): <https://www.hira.or.kr/rc/insu/insuadtcrr/InsuAdtCrtrPopup.do?mtgHmeDd=20210301&sno=2&mtgMtrRegSno=0003>

소발디: 고시 제2018-18호(약제) : <https://www.hira.or.kr/rc/insu/insuadtcrr/InsuAdtCrtrPopup.do?mtgHmeDd=20180201&sno=1&mtgMtrRegSno=0014>

엡클루사/보세비: 고시 제2022-250호 http://www.mohw.go.kr/react/jb/sjb0406vw.jsp?PAR_MENU_ID=03&MENU_ID=030406&CONT_SEQ=373441&page=1



[주1] 인터페론, 페그인터페론, 리바비린 및/또는 소포스부비르 치료에 실패한 환자

[주2] 인터페론, 페그인터페론 및 또는 리바비린 치료에 실패한 환자

[주3] 이전 치료 경험에 실패한 환자 (페그인터페론 알파/리바비린 또는 NS3/4A 단백질분해효소 저해제+페그인터페론/리바비린 요법 포함)

[주4] 페그인터페론 알파/리바비린 치료에 실패한 환자

[주5] 이전 NS5A 저해제 치료에 실패한 환자

하보니: 고시 제2019-171호(약제): <https://www.hira.or.kr/rc/insu/insuadtcrr/InsuAdtCrtrPopup.do?mtgHmeDd=20190801&sno=1&mtgMtrRegSno=0005>

마비렛: 고시 제2021-65호(약제): <https://www.hira.or.kr/rc/insu/insuadtcrr/InsuAdtCrtrPopup.do?mtgHmeDd=20210301&sno=2&mtgMtrRegSno=0003>

제파티어: 제2017-77호(약제): <https://www.hira.or.kr/rc/insu/insuadtcrr/InsuAdtCrtrPopup.do?mtgHmeDd=20170501&sno=1&mtgMtrRegSno=0001>

소발디: 고시 제2018-18호(약제): <https://www.hira.or.kr/rc/insu/insuadtcrr/InsuAdtCrtrPopup.do?mtgHmeDd=20180201&sno=1&mtgMtrRegSno=0014>

엡클루사/보세비: 고시 제2022-250호 http://www.mohw.go.kr/react/jb/sjb0406vw.jsp?PAR_MENU_ID=03&MENU_ID=030406&CONT_SEQ=373441&page=1



[주1] 인터페론, 페그인터페론, 리바비린 및/또는 소포스부비르 치료에 실패한 환자

[주2] 인터페론, 페그인터페론 및 또는 리바비린 치료에 실패한 환자


[주3] 이전 치료 경험에 실패한 환자 (페그인터페론 알파/리바비린 또는 NS3/4A 단백질분해효소 저해제+페그인터페론/리바비린 요법 포함)

[주4] 이전 NS5A 저해제 치료에 실패한 환자

하보니: 고시 제2019-171호(약제): <https://www.hira.or.kr/rc/insu/insuadtcrr/InsuAdtCrtrPopup.do?mtgHmeDd=20190801&sno=1&mtgMtrRegSno=0005>

마비렛: 고시 제2021-65호(약제): <https://www.hira.or.kr/rc/insu/insuadtcrr/InsuAdtCrtrPopup.do?mtgHmeDd=20210301&sno=2&mtgMtrRegSno=0003>

엡클루사/보세비: 고시 제2022-250호 http://www.mohw.go.kr/react/jb/sjb0406vw.jsp?PAR_MENU_ID=03&MENU_ID=030406&CONT_SEQ=373441&page=1



리바비린 투여 권장 용량, 용법

^a 체중을 기준으로, 75 kg 미만 환자의 경우 1일 1,000 mg, 75 kg 이상 환자의 경우 1,200 mg이며, 1일 2회 나누어 투여. 리바비린 시작 용량 및 치료 중 용량은 헤모글로빈 및 크레아티닌 청소율을 기준으로 감량할 수 있음. 식사와 함께 투여

^b 초회 투여용량 600mg을 1일 2회 나누어 투여. 내약성이 좋을 경우 체중에 따라 용량을 조절하여 1일 투여용량은 <75kg인 성인의 경우 1000mg, ≥75kg인 성인의 경우 1200mg 투여. 초회 투여 용량에 내약성이 좋지 않을 경우 헤모글로빈 농도 및 기타 리바비린 이상반응에 따라 감량. 식사와 함께 투여

하보니: 고시 제2019-171호(약제): <https://www.hira.or.kr/rc/insu/insuadtcrr/InsuAdtCrtrPopup.do?mtgHmeDd=20190801&sno=1&mtgMtrRegSno=0005>

소발디: 고시 제2018-18호(약제) : <https://www.hira.or.kr/rc/insu/insuadtcrr/InsuAdtCrtrPopup.do?mtgHmeDd=20180201&sno=1&mtgMtrRegSno=0014>

엡클루사/보세비: 고시 제2022-250호 http://www.mohw.go.kr/react/jb/sjb0406vw.jsp?PAR_MENU_ID=03&MENU_ID=030406&CONT_SEQ=373441&page=1

만성 콩팥병을 동반한 C형 간염

유전자형 1,2,3,4,5,6형

eGFR < 60ml/min
or dialysis

- 1) 마비렛 8주(12주/16주)*
- 용량조절 필요 없음
- 2) 엡클루사 12주*
- 용량조절 필요 없음
- 3) 하보니 12주(8주)*
- 용량조절 필요 없음
- 4) 제파티어 12주(16주)*
- 용량조절 필요 없음

*투여 약제 및 기간은 유전자형에 따른 약제선택 부분 참조 (예, 마비렛 1~6형, 하보니 1, 2, 4, 5, 6형, 제파티어 1, 4형)

*리바비린은 eGFR < 50 ml/min 이하 경우 사용시 주의를 요함

하보니: 고시 제2019-171호(약제): <https://www.hira.or.kr/rc/insu/insuadtcrr/InsuAdtCrtrPopup.do?mtgHmeDd=20190801&sno=1&mtgMtrRegSno=0005>


마비렛: 고시 제2021-65호(약제): <https://www.hira.or.kr/rc/insu/insuadtcrr/InsuAdtCrtrPopup.do?mtgHmeDd=20210301&sno=2&mtgMtrRegSno=0003>

제파티어: 제2017-77호(약제): <https://www.hira.or.kr/rc/insu/insuadtcrr/InsuAdtCrtrPopup.do?mtgHmeDd=20170501&sno=1&mtgMtrRegSno=0001>

엡클루사/보세비: 고시 제2022-250호 http://www.mohw.go.kr/react/jb/sjb0406vw.jsp?PAR_MENU_ID=03&MENU_ID=030406&CONT_SEQ=373441&page=1

이전 DAA 치료에 실패한 환자에서 pangenotypic agents의 요양급여기준 4-1

마비렛 : CTP B 이상 간경변증 제외




*시메프레비르 및 소포스부비르 또는 시메프레비르, 보세프레비르 또는 펠라프레비르와 페그인터페론 및 리바비린의 병용요법

** 레디파스비르 및 소포스부비르 또는 다클라타스비르와 페그인터페론 및 리바비린의 병용요법


마비렛: 고시 제2021-65호(약제): <https://www.hira.or.kr/rc/insu/insuadtcrr/InsuAdtCrtrPopup.do?mtgHmeDd=20210301&sno=2&mtgMtrRegSno=0003>

이전 치료에 실패한 환자에서 pangenotypic agents의 요양급여기준 4-2

엠플루사 : 비대상성 간경변증에 사용가능
 보세비 : CTP B 이상 간경변증 제외



엠플루사/보세비: 고시 제2022-250호 http://www.mohw.go.kr/react/jb/sjb0406vw.jsp?PAR_MENU_ID=03&MENU_ID=030406&CONT_SEQ=373441&page=1



* 이전 치료 경험에 실패한 환자(페그인터페론 알파/리바비린 또는 단백질분해효소 저해제+페그인터페론/리바비린 요법 포함)

- 엠펙루사/보세비- 치료력 있는 환자는 [이전 치료에 실패한 환자에서 pangenotypic agents의 요양급여기준 4-2] 를 참고, 초치료 환자와 인터페론 페그인터페론 및 또는 리바비린 치료에 실패한 환자는 치료가 동일함

하보니: 고시 제2019-171호(약제): <https://www.hira.or.kr/rc/insu/insuadtcrr/InsuAdtCrtrPopup.do?mtgHmeDd=20190801&sno=1&mtgMtrRegSno=0005>

마비렛: 고시 제2021-65호(약제): <https://www.hira.or.kr/rc/insu/insuadtcrr/InsuAdtCrtrPopup.do?mtgHmeDd=20210301&sno=2&mtgMtrRegSno=0003>

엠펙루사/보세비: 고시 제2022-250호 http://www.mohw.go.kr/react/jb/sjb0406vw.jsp?PAR_MENU_ID=03&MENU_ID=030406&CONT_SEQ=373441&page=1