



ALCOHOLIC LIVER DISEASE FACT SHEET 2023



국민건강보험
National Health Insurance Corporation



대한간학회
The Korean Association for the Study of the Liver (KASL)


- I. 고위험 음주율 및 알코올 간질환 환자 현황
 - II. 알코올 간질환 세부 상병 및 간경변증/간세포암으로 발전 비율
 - III. 의료자원 이용(Health Care Resource Utilization, HCRU) 및 의료비
 - IV. 알코올 간질환의 알코올 사용 장애 비율
-



I. 고위험 음주율 및 알코올 간질환 환자 현황

성별에 따른 음주율 변화(%)

- 주 1회 이상 음주율, 비고위험 음주율, 고위험 음주율은 2011년에서 2017년 사이 전반적으로 증가 추세임.




* 비고위험 음주군이란 일주일에 1회 이하, 남성은 6잔 이하 여성은 4잔 이하 마시는 사람을 일컫음.
* 고위험 음주군이란 일주일에 2회 이상, 남성은 7잔 이상 여성은 5잔 이상 마시는 사람을 일컫음.


성별 및 연령에 따른 고위험 음주율 변화(%)

- 고위험 음주율(%)은 남성에게 더 많았으며, 50-60대 남성을 제외하고는 남성은 매년 감소, 여성은 매년 증가하는 추세를 보임.

남성




여성



성별에 따른 3년 추적 알코올 간질환 발생률(%)


- 알코올 간질환 발생률(%)은 남성에서 비교적 높으며 남녀 모두 ‘고위험 음주군+흡연’에서 가장 높음.



*흡연이란 평생 총 5갑(100개비) 이상의 담배를 피운 적이 있으며 현재도 흡연 중인 사람을 일컫음.

성별에 따른 3년 추적 사망률(%)

- 3년 추적 사망률(%)은 '고위험 음주군+흡연'에서 가장 높으며, 상대적으로 '남성'에서 높게 나타남.



*흡연이란 평생 총 5갑(100개비) 이상의 담배를 피운 적이 있으며 현재도 흡연 중인 사람을 일컫음.

알코올 간질환 환자수(건강보험청구데이터 분석)

- 알코올 간질환 환자 숫자는 남성에서 더 많았으며 전반적으로 매년 감소하는 추세를 보임.

